

## **Памятка по приготовлению рабочего раствора дезинфицирующих средств**

Приготовлением концентрированных дезрастворов занимается специально обученное лицо. Приготовление проводится в хорошо проветриваемом помещении с применением спецодежды, резиновых перчаток, герметических очков и четырехслойной марлевой повязке. Хранят дезинфицирующие средства в местах, недоступных для детей и лиц, не занимающихся дезинфекцией. Емкости с дезинфицирующими средствами должны иметь плотно закрывающие крышки и быть промаркованы. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием названия, концентрации, а также даты приготовления, срока годности, росписи лица, приготовленного данный раствор. Запас дезсредств хранят в сухом темном месте, прохладном помещении под замком. При попадании дезсредств в глаза и на слизистую оболочку – промыть проточной водой. После применения раствора руки вымыть с мылом и смазать любым кремом.

### **ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ.**

**ОСНАЩЕНИЕ:** контейнеры или эмалированные емкости (стеклянные) с плотно притертыми крышками, ложки мерные, вода, мерная кружка, дезинфектант, рекомендованный к применению нормативными документами.

#### **Алгоритм приготовления рабочих растворов дезинфектантов:**

1. Для приготовления дезинфицирующего рабочего раствора нужной концентрации произвести расчет соотношения дезинфектанта и воды:

**0,1% - 1 г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды.**

**0,2 % - 2 г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды.**

**0,3 % - 3г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды.**

**0,5% - 5 г (мл) дезинфектанта + 995 мл воды.**

**1% - 10 г (мл) дезинфектанта + 990 мл воды**

**3% - 30 г (мл) дезинфектанта + 970 мл воды**

**5% - 50 г (мл) дезинфектанта + 950 мл воды**

**10% - 100 г (мл) дезинфектанта + 900 мл воды**

2. Налить в мерную кружку необходимое количество воды.

3. Вылить в контейнер (емкость) воду в заданном количестве.

4. Насыпать рассчитанное количество дезинфектанта в граммах (налить в миллилитрах) или опустить необходимое количество таблеток в воду в контейнер:

5. Перемешать раствор.

6. Плотно закрыть крышкой.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Срок годности указан в инструкции по использованию дезинфектанта.

Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор»

Концентрация рабочего раствора	Количество таблеток	Количество воды (л)
0,015	1	10,0
0,03	2	10,0
0,045	3	10,0
0,06	4	10,0
0,075	5	10,0
0,09	6	10,0
0,1	7	10,0
0,2	14	10,0
0,3	20	10,0